

Рифампицин**	10 мг/кг	600
Пиразинамид **	20-30 мг/кг	2500
Этамбутол **	15-25 мг/кг	2000
Стрептомицин**	15 мг/кг	2000
Канамицин**	15-20 мг/кг	1000
#Амикацин**	15-20мг/кг	1000 [93]
#Левифлоксацин**	10-15 мг/кг [177]	750-1000
#Моксифлоксацин**	400 мг-800 мг	800 [93]
Спарфлоксацин **	200-400 мг	400
Протионамид**, этионамид**	15-20 мг/кг	1000
Капреомицин**	15 – 20 мг/кг	1000
Циклосерин**	10-15 мг/кг [93]	1000 [93]
Теризидон**	10-15 мг/кг	750-1000
#Аминосалициловая кислота**	8-12 г/сут в 2-3 приема	8000 - 12000 [63,93]
Бедаквилин**	400 мг ежедневно в первые 2 недели, затем 200 мг 3 раза в неделю (с 3 недели перерыв между приемом препарата не менее 48 часов)	
#Линезолид**	600 мг[178]	1200 [63,93,179]
#Имипенем+циластатин**	2000 мг+2000 мг	2000 + 2000 [93]
#Меропенем**	3000 - 4000 мг	4000 [93]
Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат**	9.5-12.5 мг/кг	1200
Рифабутин**	150-450мг	450
Рифапентин	10 мг/кг массы тела 2-3 раза в неделю.	
Глутамил-цистеинил-глицин динатрия**	30 мг два раза в день (60 мг в сутки) первые 10 дней ежедневно, последующие дни 60 мг через день, по показаниям возможно повторение курсов	